

## Funktionalungleichungen in topologischen Vektorräumen

Peter Volkmann

**1. Ergebnis.** Ein Satz über Differentialungleichungen [7] wird auf allgemeinere Funktionalungleichungen erweitert. Dazu sei  $E$  ein reeller separierter topologischer Vektorraum, und es sei  $K$  ein *Keil* in  $E$ , d.h. eine abgeschlossene, konvexe, nichtleere Teilmenge (von  $E$ ) mit  $\lambda x \in K$  für  $x \in K$  und  $\lambda \geq 0$ .

In  $E$  werden  $x \leq y$  und  $x \ll y$  durch  $y - x \in K$  bzw.  $y - x \in \text{Int } K$  definiert, wobei  $\text{Int } K$  das Innere von  $K$  bedeutet. Unter  $K^*$  wird die Menge der linearen, stetigen Funktionale  $\varphi$  auf  $E$  mit  $\varphi(x) \geq 0$  für  $x \in K$  verstanden. Schließlich sei  $T > 0$ , und  $C([0, T], E)$  bezeichne den Raum aller stetigen  $u : [0, T] \rightarrow E$ .

**Satz.** *Es sei  $\Omega \subseteq C([0, T], E)$ ,  $\Phi : (0, T] \times \Omega \rightarrow E$ , und es seien  $v, w \in \Omega$  mit folgender Eigenschaft:*

(P) *Aus  $0 < t \leq T$ ,  $\varphi \in K^*$ ,  $v(\tau) \ll w(\tau)$  ( $0 \leq \tau < t$ ),  $\varphi(v(t)) = \varphi(w(t))$  folgt  $\varphi(\Phi(t, v)) \leq \varphi(\Phi(t, w))$ .*

*Dann ergibt sich aus*

$$(1) \quad v(0) \ll w(0), \quad \Phi(t, w) \ll \Phi(t, v) \quad (0 < t \leq T)$$

*die Ungleichung*

$$(2) \quad v(t) \ll w(t) \quad (0 \leq t \leq T).$$

*Beweis* (wie zu Satz 1 in [7]). Wäre (2) falsch, so gäbe es ein  $t \in (0, T]$  mit

$$(3) \quad v(\tau) \ll w(\tau) \quad (0 \leq \tau < t),$$

$$(4) \quad w(t) - v(t) \in \text{Rand } K.$$

Wegen (4) existiert dann ein  $\varphi \in K^*$ , so daß

$$(5) \quad \varphi(w(t) - v(t)) = 0$$

und

$$(6) \quad \varphi(x) > 0 \quad (x \in \text{Int } K)$$

ausfällt. Aus (3), (5) folgt mit (P) die Ungleichung  $\varphi(\Phi(t, v)) \leq \varphi(\Phi(t, w))$ , aber aus (1) folgt mit (6) die umgekehrte Ungleichung  $\varphi(\Phi(t, w)) < \varphi(\Phi(t, v))$ . Es ergibt sich also ein Widerspruch, und der Satz ist bewiesen.

**2. Beispiele.** 1. Es sei  $D \subseteq (0, T] \times E$ , und die Funktion

$$f(t, x) : D \rightarrow E$$

sei bezüglich der Variablen  $x$  *quasimonoton wachsend* [7], d.h. aus  $(t, x) \in D$ ,  $(t, y) \in D$ ,  $\varphi \in K^*$ ,  $x \leq y$ ,  $\varphi(x) = \varphi(y)$  folgt  $\varphi(f(t, x)) \leq \varphi(f(t, y))$ .

Setzt man  $\Omega = \{u \mid u \in C([0, T], E), (t, u(t)) \in D \text{ für } 0 < t \leq T\}$  und erklärt man  $\Phi : (0, T] \times \Omega \rightarrow E$  durch

$$\Phi(t, u) = f(t, u(t)) \quad (0 < t \leq T, u \in \Omega),$$

so ist (P) für alle  $v, w \in \Omega$  erfüllt.

Herzog [2] gibt einen Überblick über Quasimonotonie und ihre Anwendungen.

2. Es sei  $\Omega$  die Menge der stetigen  $u : [0, T] \rightarrow E$ , so daß die linksseitige Ableitung

$$u'_-(t) = \lim_{h \uparrow 0} \frac{u(t+h) - u(t)}{h}$$

für alle  $t \in (0, T]$  existiert. Erklärt man  $\Phi : (0, T] \times \Omega \rightarrow E$  durch

$$\Phi(t, u) = -u'_-(t) \quad (0 < t \leq T, u \in \Omega),$$

so ist (P) für alle  $v, w \in \Omega$  erfüllt.

3. Für  $F : [0, T] \rightarrow [0, T]$  gelte  $0 \leq F(t) \leq t$  ( $0 \leq t \leq T$ ), und mit  $\Omega = C([0, T], E)$  sei  $\Phi : (0, T] \times \Omega \rightarrow E$  definiert durch

$$\Phi(t, u) = u(F(t)) \quad (0 < t \leq T, u \in \Omega).$$

Dann gilt (P) für alle  $v, w \in \Omega$ .

4. Für  $k = 1, 2, \dots, n$  seien  $\Phi_k : (0, T] \times \Omega_k \rightarrow E$ , wobei  $\Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_n \subseteq C([0, T], E)$ . Es seien  $v, w \in \Omega_1 \cap \dots \cap \Omega_n$ , und (P) gelte mit allen  $\Phi_1, \dots, \Phi_n$  (an Stelle von  $\Phi$ ). Setzt man  $\Omega = \Omega_1 \cap \dots \cap \Omega_n$  und erklärt man  $\Phi : (0, T] \times \Omega \rightarrow E$  durch

$$(7) \quad \Phi(t, u) = \Phi_1(t, u) + \dots + \Phi_n(t, u) \quad (0 < t \leq T, u \in \Omega),$$

so gilt (P) auch mit diesem Operator  $\Phi$ . Statt (7) kann allgemeiner

$$(8) \quad \Phi(t, u) = \alpha_1(t)\Phi_1(t, u) + \dots + \alpha_n(t)\Phi_n(t, u)$$

mit  $\alpha_1, \dots, \alpha_n : (0, T] \rightarrow [0, \infty)$  genommen werden.

5. Gemäß (7) (d.h. durch Addition) lassen sich die beiden  $\Phi$  aus den Beispielen 1, 2 kombinieren. In diesem Falle liefert das hier vorliegende Ergebnis den Satz 1 aus [7], also einen Satz über Differentialungleichungen, welche von der Differentialgleichung

$$(9) \quad u'(t) = f(t, u(t)) \quad (0 \leq t \leq T)$$

mit einer bezüglich  $x$  quasimonoton wachsenden rechten Seite  $f(t, x)$  herühren.

6. Entsprechende Kombination der  $\Phi$  aus den Beispielen 1, 3 führt auf einen Ungleichungssatz in Zusammenhang mit der Funktionalgleichung

$$(10) \quad u(F(t)) + f(t, u(t)) = 0 \quad (0 \leq t \leq T),$$

wobei  $0 \leq F(t) \leq t$  gilt und  $f(t, x)$  bezüglich  $x$  wieder quasimonoton wächst. Funktionalgleichungen der Form (10) werden im Übersichtsartikel von Baron und Jarczyk [1] behandelt.

7. Schließlich kann, (8) entsprechend, ein Ungleichungssatz für die (9), (10) verallgemeinernde Gleichung

$$\alpha(t)u'(t) = \beta(t)u(F(t)) + f(t, u(t)) \quad (0 \leq t \leq T)$$

mit  $\alpha, \beta : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$  formuliert werden. Auch etwas verwickeltere Beispiele lassen sich leicht angeben.

**3. Weitere Zusammenhänge mit der Literatur.** Resultate über Differential-Funktional-Ungleichungen findet man bei Herzog [3], [4]. In [5] benutzt Herzog Differentialungleichungen beim Existenzbeweis für Lösungen von Funktionalgleichungen der Form  $f(\omega, u(\omega), u(g_1(\omega)), \dots, u(g_m(\omega))) = 0$  in  $\mathbb{R}^n$ ; dabei variiert  $\omega$  in einem metrischen Raume. Es dürfte auch nicht schwer sein, die in [6] gegebene Version des Lemmas von Nagumo und Westphal über parabolische Differentialungleichungen in den Rahmen der vorliegenden Arbeit zu stellen.

## Literatur

[1] Karol Baron und Witold Jarczyk: *Recent results on functional equations in a single variable, perspectives and open problems*. *Aequationes Math.* **61**, 1-48 (2001).

[2] Gerd Herzog: *Quasimonotonicity*. Nonlinear Analysis **47**, 2213-2224 (2001).

[3] —: *Second order differential-functional inequalities for bounded functions*. Erscheint in Positivity.

[4] —: *Differential-functional inequalities for bounded vector valued functions*. Erscheint in Z. Analysis Anwendungen.

[5] —: *Semicontinuous solutions of systems of functional equations*. Manuskript.

[6] Alice Simon und Peter Volkmann: *Parabolic inequalities in ordered topological vector spaces*. Nonlinear Analysis **25**, 1051-1054 (1995).

[7] Peter Volkmann: *Gewöhnliche Differentialungleichungen mit quasimonoton wachsenden Funktionen in topologischen Vektorräumen*. Math. Z. **127**, 157-164 (1972).

*Typoskript:* Marion Ewald.

*Adresse des Autors:* Mathematisches Institut I, Universität, 76128 Karlsruhe, Deutschland.